


Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos pšenice, řepky a kukuřice při sníženém N hnojení o 40% (přesné maloparcelkové pokusy v roce 2022)



Návod k použití, dávkování

Plodina	Dávka/ha	Dávka vody/ha	Vhodný termín aplikace
Ozimé a jarní obilniny	235 ml	150–400 l	Od dvou listů do plně vyvinutého praporcového listu, BBCH 12–39. Možná společná aplikace s herbicidy, fungicidy, insekticidy, CCC nebo Agrostim TRIA
Řepka olejka, hořčice, mák	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do začátku kvetení, BBCH 12–59. Možná společná aplikace s herbicidy, fungicidy, insekticidy nebo Agrostim TRIA
Kukuřice	235 ml	50–150 l	Aplikace do seťového lůžka při výsevu, BBCH 00
	235 ml	100–400 l	Od dvou do osmi listů, BBCH 12–24. Možná společná aplikace s postemergentními herbicidy
Brambory	235 ml	50–150 l	Aplikace na dno brázdy při výsadbě, BBCH 00
	235 ml	100–400 l	Od vývinu prvních listů do počátku prodlužovacího růstu, BBCH 12–29. Možná společná aplikace s fungicidy, insekticidy nebo Agrostim TRIA
Slunečnice	235 ml	150–400 l	Od dvou listů do počátku prodlužovacího růstu, BBCH 12–29. Možná společná aplikace s fungicidy, insekticidy nebo Agrostim TRIA
Luskoviny včetně sóje	235 ml	150–400 l	Ve fázi dvou až čtyřech listů, BBCH 12–14
Brukvovitá zelenina včetně růžičková kapusta, květák, brokolice	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do konce prodlužovacího růstu, BBCH 12–40
Cibulová zelenina včetně cibule, česnek, šalotka, pórek	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do konce prodlužovacího růstu, BBCH 12–40
Kořenová a stonková zelenina včetně mrkev, celer, tuřín, kedlubna, čekanka, brukev	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do konce prodlužovacího růstu, BBCH 12–40
Listová zelenina	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do konce prodlužovacího růstu, BBCH 12–40
Jahody	235 ml	200–400 l	Od dvou listů do začátku kvetení, BBCH 12–49

Mísitelnost a kompatibilita

Pro zajištění lepší pokrývnosti se doporučuje při aplikaci použít neiontové smáčedlo např. multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07% (0,1 l/ha v 150 l vody/ha). Nemíchejte Enceru přímo s koncentráty přípravků na ochranu rostlin ani hnojiv. Při mísení s jinými přípravky nebo hnojivy nejdříve připravte postřikový aplikační roztok v dostatečném množství vody a jako poslední přidejte do směsi Enceru.